

## 2023 年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题 A 卷

\*

招生专业与代码:口腔医学(专业学位) 105200

考试科目名称及代码:口腔综合 352

考生注意: 所有答案必须写在答题纸(卷)上,写在本试题上一律不给分。

- 名词解释 (共20小题, 每题3分, 共60分)
- 1、咀嚼效率 2、Freeway space 3、Embrasures 4、正中止接触

- 5、缩余釉上皮 6、Intrapony pocket 7、上皮肌上皮岛 8、角化包膜

- 9、Riga-Fede 溃疡 10、穿黏膜附着 11、树脂突 12、Masseteric -buccal space

- 13、轴型皮瓣 14、Block anesthesia of inferior alveolar nerve 15、桩核冠
- 16、connector 17、Implant 18、Growth pattern 19、Bolton 指数 20、冠角
- 单项选择题(共60题,每题2分,共120分)
- 1、下述对哺乳动物的牙描述中正确的是:
- A.同形牙, 无根牙, 借纤维膜附着于颌骨的边缘
- B.同形牙,有较完善的牙根,位于颌骨的牙槽窝内
- C.同形牙, 有较完善的牙根, 借纤维膜附着于颌骨的边缘
- D.异形牙, 牙根小, 埋于颌骨的一侧
- E.异形牙, 牙根发达, 深埋于牙槽骨内
- 2、距中线最远的线角是:
- A.远牙合线角 B.近牙合线角 C.舌切线角 D.唇切线角 E.远唇线角
- 3、牙冠唇(颊)舌面突度的生理意义描述错误的是:
- A. 食物沿正常的突度滑至口腔,对牙龈起按摩作用 B. 颈 1/3 突度可扩展龈缘
- C. 突度过小, 牙龈会受到食物冲击而受伤 D. 正常的突度有防止食物嵌塞的作用
- E. 突度过大, 牙龈会失去食物的按摩而萎缩
- 4、牙尖交错牙合时第一磨牙的咬合关系是:
- A.下颌第一磨牙颊沟对着上颌第一磨牙远中颊尖
- B.下颌第一磨牙颊沟对着上颌第一磨牙近中颊尖
- C.下颌第二磨牙颊沟对着上颌第二磨牙近中颊尖
- D.下颌第一磨牙颊沟对着上颌第一磨牙颊尖
- E.下颌第二磨牙颊沟对着上颌第二磨牙远中颊尖
- 5、口颌面部皮肤、黏膜、牙髓牙周、颞下颌关节等感受器受到疼痛刺激时可引发 A.颌跳反射 B.牵张反射 C.开口反射 D.下颌卸载反射 E.水平颌反射

- 6、后牙牙合运循环的功能阶段是:
- A.下颌向下向外

B.上下颌磨牙颊尖相对至颊舌尖分离

C.下颌向上,同名牙尖相对 D.下颌上升

- E.下颌向下向工作侧
- 7、在近远中方向上,下颌牙牙冠的倾斜规律不包括哪一项?

A.下颌各切牙均较正 B.下颌尖牙的根部稍偏向远中 C.下颌前磨牙向近中倾斜 D.下颌第一磨牙位置较正

- E.下颌第二、三磨牙的牙根略向远中倾斜
- 8、Spee 曲线最低点位于:

A.下颌第二磨牙的近颊尖 B.下颌第一磨牙的远颊尖

C.下颌第一磨牙的近颊尖 D.下颌第二磨牙的远颊尖

E.下颌第二前磨牙的颊尖

- 9、对建立正常的咬合关系起重要作用,被称为牙合之关键的牙是:
- A.切牙 B.第一前磨牙 C.第二前磨牙 D.第一磨牙 E.尖牙
- 10、上颌第一磨牙斜嵴是由:
- A.近中颊尖三角嵴与近中舌尖三角嵴相连而成
- B.远中舌尖三角嵴与远中颊尖三角嵴相连而成
- C.近中颊尖三角嵴与远中舌尖三角嵴相连而成
- D.远中颊尖三角嵴与近中舌尖三角嵴相连而成
- E.近中颊尖三角嵴与远中颊尖三角嵴相连而成
- 11、下述哪一个牙的颈嵴最突:
- A.上颌乳尖牙 B.下颌乳尖牙 C.上颌尖牙 D.下颌尖牙 E.上、下颌尖牙
- 12、上颌中切牙髓室缺乏:

A.髓室底 B.髓室顶 C.近中髓壁

D.远中髓壁 E.唇侧髓壁与舌侧髓壁

- 13、以下关于牙釉质的形成过程,说法错误的是:
- A. 牙本质形成后内釉上皮才开始分化为成釉细胞分泌釉质基质
- B.成釉细胞形成皱褶缘时可吸收蛋白,形成平滑缘时可使无机离子渗出
- C.成釉细胞的平滑缘和刷状缘交替出现, 贯穿釉质形成的全过程
- D.在牙釉质晶体生长中起重要作用的蛋白质主要是釉原蛋白
- E.牙釉质形成后基质很快矿化
- 14、以下哪种结构可见于牙骨质:
- A.新生线 B.欧文线 C.反转线 D.芮氏线 E.间骨板

- 15、下列哪种情况一般不会出现破骨细胞:
- A.牙槽骨改建时蚕食状凹陷的骨表面 B.牙萌出时恒牙胚与乳牙根之间
- C. 牙近中移动时牙根远中面的牙槽骨 D. 牙近中移动时牙根近中面的牙槽骨
- E.活动期牙周炎时的牙槽骨
- 16、口腔上皮正角化层没有细胞核的原因主要是由于以下哪种酶的作用:
- A.胶原酶
- B.核酸酶
- C.磷脂酶
- D.蛋白酶 E.以上皆是
- 17、以下关于龋病的细菌和菌斑,说法错误的是:
- A.南斑由基底层、中间层和表层三层结构组成
- B.菌斑的形成包括获得性膜的形成、细菌的黏附和聚集、菌斑的成熟
- C.致龋菌主要有变形链球菌、乳杆菌和放线菌
- D.乳杆菌与根面龋的发生密切相关
- E.目前认为致龋力以变形链球菌最强
- 18、舌侧后缘见一溃疡,直径 1cm,疼痛不明显,镜下活检可见 keratin pearl,一 般考虑为以下哪种病变:
- A.乳头状瘤 B.鳞癌 C.腺周口疮 D.阿弗他溃疡 E.结核性溃疡
- 19、男性患者,52岁,牙龈发红数周,活检可见上皮全层剥脱,形成基层下疱, 大量淋巴细胞浸润,首选考虑为:

- A.扁平苔藓 B.寻常型天疱疮 C.盘状红斑狼疮
- D.红斑
- E.黏膜类天疱疮
- 20、患者女性,45岁,腭部出现溃疡5天,偶有刺激痛,查见腭部溃疡呈火山口 样,直径1cm,深达骨面。活检见溃疡周围腺小叶坏死,腺导管上皮鳞状化生, 可见大小不等的上皮岛, 化生的鳞状细胞形态较一致, 首选考虑为:
- A.鳞癌
- B.黏液表皮样癌 C.坏死性唾液腺化生
- D.舍格伦综合征 E.慢性唾液腺炎
- 21、以下关于牙源性角化囊肿说法错误的是:
- A.病变较大时仍不引起明显的颌骨膨大
- B.X 线可表现为多房性透射区,边缘呈扇形切迹
- C.衬里上皮为较厚的鳞状上皮,可呈指状外突性生长
- D.衬里上皮具有较高的增殖活性
- E.纤维性囊壁较薄,可见微小的子囊或上皮岛
- 22、以下哪项是真性肿瘤:
- A.牙龈瘤 B.纤维上皮息肉 C.疣状黄瘤 D.乳头状增生 E.角化棘皮瘤

- 23、男,23岁,口底囊性肿物数年,可活动,压迫后出现凹陷。病检见囊肿内含 灰白色豆腐渣样物,囊壁可见毛囊、皮脂腺等结构。最可能的病理诊断为:
- A.甲状舌管囊肿 B. 鳃裂囊肿 C.鼻唇囊肿 D. 皮样囊肿 E.表皮样囊肿
- 24、镜下见肿瘤细胞棘层松解,形成腔隙和腺管分化的外观,考虑为:
- A. 腺鳞癌 B. 基底细胞样鳞状细胞癌 C. 腺样鳞状细胞癌
- D.疣状癌 E.乳头状瘤鳞状细胞癌
- 25、患者口周有黑痂,皮肤出现虹膜状红斑,首先考虑为
- A. 多形红斑 B. 盘状红斑狼疮 C. 寻常型天疱疮 D. 扁平苔藓 E. 接触性口炎
- 26、针刺反应阳性多见于
- A.扁平苔藓 B.疱疮 C.白塞病 D.系统性红斑狼疮 E.类天疱疮
- 27、广泛型侵袭性牙周炎的发病特点,哪一项错误
- A.牙周破坏程度与年龄不相称 B.有广泛的邻面附着丧失
- C.一般患者对常规治疗无明显的疗效 D.可伴有全身症状
- E. 严重及快速的骨破坏
- 28、下列哪种药物不会引起药物性牙龈增生
- A.苯妥英钠
- B.环孢菌素
- C.NSAIDs 类药物

- D.心痛定
- E.钙通道阻断剂
- 29、以下牙髓病类型不是按照组织病理学分类划分的是
- A.可复性牙髓炎 B.牙髓充血 C.急性牙髓炎
- D.慢性牙髓炎 E.牙内吸收
- 30、不符合急性化脓性根尖周炎根尖脓肿阶段的临床表现是
- A.能准确定位患牙 B.患牙伸长感加重,出现早接触
- C.出现面部蜂窝织炎 D.相应区域可能有淋巴结肿大触痛 E.患牙松动
- 31、患者,35岁,左上6远中邻面深龋进行治疗,去龋未尽穿髓,穿髓孔一钻针 大小,则该患牙应如何处理
- A. 氢氧化钙制剂直接盖髓,氧化锌丁香油安抚观察 2 周
- B. 氢氧化钙制剂直接盖髓观察 3 个月, 后视情况处理
- C.活髓切断术
- D.根管治疗
- E.干髓术
- 32、下列不属于牙齿脱位后伴发的各种并发症的是
- A. 牙髓坏死:
- B. 牙髓腔变窄或消失:
- C. 牙根外吸收:
- D.边缘性牙槽突吸收; E.逆行性牙髓炎;

- 33、下列有关龋病再矿化治疗的叙述中,不正确的是 A.是消除早期龋损的一种治疗方法; B.可用于光滑面早期釉质龋; C.龋易感者的龋病预防: D.再矿化液的 pH 一般调至 5; E.再矿化液主要含有不同比例的钙、磷和氟; 34、洗必泰溶液是口腔常用的含漱液,其浓度是 A. 0.01%-0.03% B. 0.05%-0.12% C. 0.3%-0.5% D. 1%-3 % E. 3%-5% 35、以下有明显呼吸抑制的全麻药物是 A. 芬太尼 B. 依托咪酯 C. 地西泮 D. 异丙酚 E. 丁卡因 36、正颌外科手术骨切开线设计时,为避免牙髓坏死,切骨线应距根尖 A. 1mm B. 2mm C. 3mm D. 4mm E. 5mm 37、多形性腺瘤的恶变率有 A. 10%以下 B. 15%--25% C. 30%左右 D. 50%左右 E. 60%左右 38、拔上颌前牙, 脱位时用力的方向: A.近中 B.唇侧 C.腭侧 D.远中 E.前下 39、女,35岁,颌面部损伤伴昏迷,经现场紧急处理后,准备转送医院进一步治 疗,运送患者正确的体位是 A.俯卧位 B.侧卧位 C.仰卧位 D.半卧位 E.随意体位 40、下列描述不属于种植术并发症的是 A.上颌窦或鼻腔损伤 B.种植体植入位置不佳
- C. 牙龈坏死 D. 创口裂开 E. 神经损伤
- 41、急性化脓性腮腺炎的主要致病菌
- A.链球菌 B.大肠杆菌 C. 肺炎双球菌
- D.金黄色葡萄球菌 E.白色念珠菌
- 42、拔牙术引发细菌性心内膜炎的致病菌是
- A. 金黄色葡萄球菌 B. 大肠杆菌 C. 甲型溶血性链球菌
- D.乙型溶血性链球菌 E.肺炎球菌
- 43、下列哪一项不是影响金-瓷结合的因素:
- A. 金属表面有污染
- B.合金和瓷材料热膨胀系数匹配合理
- C.烧结温度、升温速率和烧结次数变化
- D.石膏代型的制作
- E.环境温度影响

- 44、下列哪项不是基于陶瓷主要成分分类:
- A.长石质陶瓷 B.二硅酸锂增强玻璃陶瓷
- C.热压铸全瓷材料 D.氧化锆基全瓷材料 E.磷灰石基玻璃陶瓷
- 45、相较于充填体而言,以下哪点不是嵌体的优点:
- A.具有更好的机械性能,特别是金合金嵌体具有突出的耐腐蚀性能;
- B.可更好的恢复邻接关系,避免食物嵌塞;
- C.瓷嵌体和树脂嵌体与牙体组织有良好的粘接性能,相比树脂、玻璃离子充填体, 边缘收缩性更好,美观性更佳
- D.可保证龈缘位置精确、边缘密合, 避免悬突:
- E.固位力较差,因此有磨牙症者慎用。
- 46、下列哪项不是根据卡环的形态结构分类的:
- A. Aker clasp B. ring clasp C. long arm clasp
- D. one arm clasp E. bar clasp
- 47、下列哪项不是可摘局部义齿基托的形态和美学要求:
- A.基托组织面应与组织外形一致,密合无压痛,无毛刺,除局部缓冲区外,一般 需打磨或抛光;
- B.基托磨光面需高度抛光:
- C.对于牙槽嵴丰满的前牙区可不放基托;
- D.在腭面形成腭降凸、龈乳头及腭皱形态:
- E.在人工牙冠颈缘下显出根部形态,使得立体感强,自然逼真。
- 48、下列哪项不是可摘局部义齿基牙的选择原则:
- A. 选择健康牙作基牙:
- B.松动 II 度或牙槽骨吸收 II 度的牙不宜单独选作基牙;
- C.基牙应具有适宜的固位形态, 其倒凹深度不超过 1mm, 坡度应大于 20 度:
- D.基牙数目不宜过多,一般以 2~4 个为宜;
- E.首选近缺牙间隙两端的天然牙作基牙,缺牙间隙的一端选用 2 个牙作基牙时, 2 个基牙之间愈近愈好。
- 49、下列哪项不是口腔前庭的标志:
- A. 颊系带: B. 颧突: C. 颊棚区: D. 舌系带: E. 远中颊角区。
- 50、关于牙种植成功的标准,哪项除外:
- A.种植体在行使功能时无任何临床动度;
- B.种植体功能负载1年后,垂直方向骨吸收每年应小于0.2mm;
- C.种植体无持续性或不可逆的症状,如疼痛、麻木、坏死等;
- D.X 线显示种植体周无透射区:
- E.达到上述要求者,5年成功率90%以上,10年成功率85%以上为最低标准。

- 51、下列关于修复体数字化设计和制作技术不正确的是:
- A.修复体数字化设计技术是基于 CAD 技术,对各类口腔修复体或口腔临床辅助诊疗装置的三维形态进行交互式或自动化建模的可视化设计技术;
- B.口腔数字化设计技术可用于口腔基底冠桥、全冠桥等设计,但不可用于全口义齿、颜面赝复体等;
- C.口腔数字化设计软件包括三维扫描数据输入与预处理阶段、个性化修复体设计 阶段和数据封装与输出阶段等三个阶段;
- D.修复体数字化制作技术即应用 CAM 技术加工制作口腔医学诊断模型或医疗装置的技术:
- E.修复体数字化制作技术包括切削成型技术和快速成型技术。
- 52、临床上上前牙切缘覆盖下前牙牙冠唇面以上, 称为深覆牙合:

A. 1/3 B. 1/2 C.2/3 D.全部 E.以上均不是

- 53、成人正畸的目标是:
- A.成人正畸的目标是达到理想的牙合关系
- B.成人正畸的目标是追求前牙的美观而不是健康的牙合合关系
- C.成人正畸的目标是达到个体化的最佳牙合关系
- D.成人正畸的目标是统一的,不用考虑个体的具体需要
- E.成人正畸的目标更多强调美观
- 54、6岁儿童脑、脊神经系统的生长发背可达到成人的:

A.40% B.50% C.60%

D.90% E.80%

- 55、颅部和面部的容量比在成人时是:
- A. 8:1 B. 6:1 C. 4:1 D. 2:1 E. 1:1
- 56、下列哪种正畸治疗不是成人辅助性正畸治疗:
- A.修复前的小范围牙移动
- B.牙列中的开展失牙间隙
- C.改善前牙深覆牙合以利于修复治疗
- D.前牙打开咬合改正前牙深覆牙合
- E.压低伸长的对牙合牙为修复治疗创造条件
- 57、导致正畸治疗中牙周组织炎症的直接原因是:

A. 牙合 创伤 B. 矫治器的机械刺激 C. 细菌种类的改变

D.菌斑滞留 E.不适当的牙齿移动

58、常用的颅面分界线有:

A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个 E. 5 个

59、牙列拥挤的病理机制是牙量骨量不调,主要表现为:

A.牙量<骨量

B.牙量=骨量

C.牙量>骨量

D.多生牙

E.以上均不是

60、 I 度前牙深覆盖指上切牙切端至下前牙唇面的最大水平距离:

A. < 6 mm

B. < 5 mm

C. < 8 mm

D. < 4 mm

E. < 3 mm

- 三、论述题(共12题,共120分)
- 1、论述混牙牙合暂时性错牙合的特征(9分)
- 2、牙釉质中含有机物较多的结构有哪些?试述其结构特点和意义(9分)
- 3、论述寻常型天疱疮的口腔临床表现及诊断依据(9分)
- 4、论述逐步后退法和逐步深入法的优缺点(9分)
- 5、论述骨的质量分类对种植的影响(9分)
- 6、论述常见的颌下区肿物(9分)
- 7、阐述全瓷冠的优点及缺点(9分)
- 8、全口义齿模型的要求有哪些(9分)
- 9、错否的局部危害性有哪些? (9分)
- 10、错死畸形的矫治目标(9分)
- 11、论述 retruded contact position 的特点和意义(15分)
- 12、论述成釉细胞瘤的病理分型、病理特点以及各型的生物学行为(15分)